ZENBEXUS™ REMS | Lista de verificación de asesoramiento de farmacia
Para mujeres que pueden quedar embarazadas y para hombres

Todas las farmacias certificadas por el programa de Evaluación de riesgos y estrategia de mitigación (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de ZENBEXUS deben completar este formulario antes de cada entrega de ZENBEXUS™ (iberdomida) para mujeres que puedan quedar embarazadas y para hombres.
Envíe esta lista de verificación completada a través de los siguientes medios:

- **en línea,** en www.BMSREMSPatientSafety.com; **o**
- por **correo electrónico** a REMSContactCenter@bms.com; **o**
- por **fax** a 1-877-296-1932.

No despache ZENBEXUS hasta que el programa de REMS confirme el despacho.

Información de la farmacia *(los campos marcados con * son OBLIGATORIOS).*		
*Nombre de la farmacia:		
*Línea de dirección 1:		
Línea de dirección 2:		
*Ciudad:	*Estado:	*Código postal:
*Identificador nacional del proveedor (National Provider Identifier, NPI):		
*Número de teléfono del consultorio:		
Información del paciente		
*Nombre (legal):	*Apellido (legal):	*Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):
Información del proveedor de atención médica (Healthcare Provider, HCP) que emite la receta		
*Nombre:	*Apellido:	
*Identificador nacional del proveedor (National Provider Identifier, NPI):		

Continúa en la página siguiente

ZENBEXUS™ REMS | Lista de verificación de asesoramiento de farmacia
Para mujeres que pueden quedar embarazadas y para hombres

Información de la farmacia (cont.) *(los campos marcados con * son OBLIGATORIOS).*

***He asesorado a la paciente de sexo femenino que puede quedar embarazada sobre lo siguiente:**

- ☐ El riesgo de toxicidad embriofetal.
- ☐ La necesidad de utilizar métodos anticonceptivos eficaces cada vez que tenga relaciones sexuales, desde, al menos, 4 semanas antes de tomar ZENBEXUSTM (iberdomida), mientras esté tomando ZENBEXUS y durante, al menos, 4 semanas después de dejar de tomar ZENBEXUS.
- ☐ La necesidad de realizar pruebas de embarazo cada 4 semanas si sus ciclos menstruales son regulares o cada 2 semanas si sus ciclos menstruales son irregulares.
- ☐ La necesidad de completar una encuesta destinada al paciente cada 4 semanas.
- ☐ La necesidad de contactar inmediatamente al médico prescriptor e interrumpir el tratamiento si la paciente no tiene un periodo menstrual o si se sospecha un embarazo.
- ☐ No donar sangre durante el tratamiento ni durante las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento con ZENBEXUS.
- ☐ No donar óvulos durante el tratamiento ni durante las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento con ZENBEXUS.
- ☐ Retorno de ZENBEXUS no utilizado a un programa de devolución de medicamentos.
- ☐ No compartir ZENBEXUS.

***He asesorado al paciente de sexo masculino sobre lo siguiente:**

- ☐ El riesgo de toxicidad embriofetal.
- ☐ La necesidad de utilizar condones masculinos de látex o sintéticos cada vez que tenga relaciones sexuales, desde, al menos, 4 semanas antes de tomar Zenbexus (iberdomida), mientras esté tomando Zenbexus y durante, al menos, 4 semanas después de dejar de tomar Zenbexus.
- ☐ No donar esperma durante el tratamiento ni durante las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento con ZENBEXUS.
- ☐ No donar sangre durante el tratamiento ni durante las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento con ZENBEXUS.
- ☐ La necesidad de completar una encuesta destinada al paciente cada 4 semanas.
- ☐ Retorno de ZENBEXUS no utilizado a un programa de devolución de medicamentos.
- ☐ No compartir ZENBEXUS.

*Nombre del asesor:	*Fecha:

Bristol Myers Squibb®

© 2026 Bristol-Myers Squibb Company

2070-US-2600390 08/26